

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE ARBOVIRUS

Santiago del Estero · Temporada 2026–2027

Actualización al 25 de septiembre de 2026 | Basado en BENSE36 y actualizaciones climáticas de septiembre

SÍNTESIS EJECUTIVA

El escenario nacional continúa con baja actividad de dengue y sin transmisión autóctona sostenida. Sin embargo, la detección repetida de casos importados —incluido DENV-3—, el antecedente reciente de chikungunya concentrado en el NOA y un El Niño fuerte/muy fuerte con alta probabilidad de persistir durante el verano 2026–2027 justifican vigilancia reforzada y preparación anticipada en Santiago del Estero.

1. Situación epidemiológica actual

Dengue. Al cierre de la SE 36, Argentina mantiene un escenario de muy baja circulación. Los casos confirmados de la temporada 2026–2027 corresponden a introducciones asociadas a viajes; la aparición de DENV-3 importado constituye un evento de vigilancia relevante por el potencial de introducción de serotipos en áreas con presencia de *Aedes aegypti*. Chikungunya. No se notificaron nuevos casos confirmados en la SE 36. Se mantiene un caso confirmado en Salta y seis casos probables (cinco en Salta y uno en Formosa). El antecedente de la temporada 2025–2026, con brote concentrado principalmente en el NOA, obliga a sostener la búsqueda activa de CHIKV entre los síndromes febriles agudos inespecíficos.

Zika. No se identifica en las fuentes oficiales revisadas una señal nueva de expansión que modifique materialmente el riesgo inmediato para Santiago del Estero. Debe mantenerse dentro del diagnóstico diferencial y de la vigilancia molecular integrada.

2. Contexto regional de las Américas

OPS/OMS informó 1.626.962 casos sospechosos de dengue en las Américas hasta la SE 34 de 2026 (156 casos por 100.000 habitantes), 57% menos que en igual período de 2025 y 64% menos que el promedio de los cinco años previos. La presión epidémica regional es, por el momento, sustancialmente menor que la observada en temporadas recientes.

3. Componente climático y riesgo vectorial

ENSO / El Niño. El SMN informa fase El Niño en septiembre de 2026, con 100% de probabilidad de continuidad durante septiembre–octubre–noviembre y con intensidad fuerte o muy fuerte. NOAA/CPC informó el 10/09/2026 que El Niño continúa fortaleciéndose y asignó más de 90% de probabilidad a un evento muy fuerte durante el otoño–invierno del hemisferio norte 2026–2027; su pronóstico oficial mantiene 100% de probabilidad de El Niño hasta enero–febrero–marzo de 2027, 97% en febrero–marzo–abril y 82% en marzo–abril–mayo.

Interpretación para Santiago del Estero. Un El Niño intenso no debe traducirse automáticamente como lluvias excesivas en toda la provincia. El riesgo vectorial dependerá de la combinación local de precipitación efectiva, persistencia de recipientes con agua, humedad y, especialmente, temperaturas mínimas suficientemente altas para sostener supervivencia y actividad de *Aedes aegypti*. El escenario climático amplía la ventana potencial de riesgo, por lo que se recomienda seguimiento semanal de variables meteorológicas y entomológicas.

4. Implicancias para la red provincial de salud

- Sostener vigilancia clínica intensificada de síndrome febril agudo inespecífico (SFAI), incluyendo antecedentes de viaje y nexos epidemiológicos.
- Priorizar qRT-PCR diferencial DENV/ZIKV/CHIKV durante la fase aguda según algoritmo vigente, con especial atención a cuadros con artralgias intensas o poliartralgia.
- Tipificar/serotipificar los casos de dengue positivos y priorizar la investigación de DENV-3 y de cualquier caso sin antecedente de viaje.
- Notificar e investigar de manera inmediata todo caso probable o confirmado de chikungunya, especialmente ante vínculos con NOA o países limítrofes.
- Integrar semanalmente resultados de laboratorio, ovitrampas/indicadores entomológicos, temperatura mínima y precipitación, utilizando ventanas de rezago de 1–4 semanas.
- Reforzar control focal y eliminación de criaderos antes del ascenso sostenido de indicadores entomológicos y no esperar a la aparición de transmisión humana sostenida.

5. Umbrales sugeridos para escalamiento de alerta

Indicador	Señal de escalamiento	Respuesta sugerida
Dengue	Caso autóctono de DENV-3 sin antecedente de viaje en Argentina/NOA	Investigación inmediata, bloqueo focal y vigilancia molecular reforzada
Chikungunya	Nuevo foco autóctono fuera del área actualmente afectada o caso en Santiago del Estero	Escalar búsqueda activa, diagnóstico molecular y control vectorial
Entomología	Asenso sostenido de oviposición/índices vectoriales	Intervención territorial anticipada y focalizada
Clima	Secuencia de lluvias + aumento persistente de T° mínima	Aumentar frecuencia de vigilancia y preparación asistencial

6. Tablero de estratificación de riesgo

Evento / componente	Riesgo actual	Tendencia	Fundamento operativo
Dengue	BAJO	↔ / vigilancia	Sin transmisión autóctona sostenida; importaciones de DENV-3 requieren vigilancia.
Chikungunya	MODERADO	↔	Caso confirmado y probables en NOA/NEA; antecedente de brote regional reciente.
Zika	BAJO	↔	Sin señal oficial nueva de expansión relevante para la provincia.
Riesgo vectorial primavera-verano	ALTO	↑	El Niño fuerte/muy fuerte y ventana climática potencialmente prolongada.
Riesgo arboviral global prospectivo	ALTO	↑	Convergencia de susceptibilidad vectorial, movilidad e introducciones virales.

Escala: BAJO = vigilancia rutinaria reforzada · MODERADO = vigilancia intensificada · ALTO = preparación/intervención anticipada · MUY ALTO = respuesta ampliada

7. Fuentes oficiales consultadas

- Ministerio de Salud de la Nación. Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N.º 826, SE 36 (6–12 septiembre 2026), actualización publicada 22/09/2026.
- Ministerio de Salud de la Nación. BEN N.º 823, SE 33. Informe de cierre de temporada de arbovirosis 2025–2026.
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), septiembre 2026.
- NOAA / Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion, 10/09/2026; Official ENSO Probabilities, septiembre 2026.
- OPS/OMS. Situación epidemiológica del dengue en las Américas, SE 34 de 2026; actualización 18/09/2026.

Nota técnica

Este informe es un instrumento de vigilancia y preparación sanitaria. La estratificación resume el escenario disponible a la fecha y debe actualizarse ante nueva evidencia epidemiológica, virológica, entomológica o meteorológica. No reemplaza las definiciones de caso, algoritmos diagnósticos ni lineamientos oficiales vigentes.

Dirección CEAMM
Ministerio de Salud de Santiago del Estero